Aula 32: momento de inércia e energia de rotação

- Rever as propriedades matemáticas e implicações físicas do momento de inércia com relação a eixos distintos.
- Exercitar o cálculo do momento de inércia de formas geométricas e distribuições de massa um pouco mais complicadas.
- Praticar o uso do momento de inércia em situações envolvendo movimento rotacional.

(Reforçar o que vimos na aula 31)

Momento de inércia

Momento de inércia

Dependência com a disposição geométrica

Momento de inércia

Haltere

Dependência com o eixo de rotação

Considere o sistema da figura abaixo. Cada uma das esferas (pequenas) têm massa 3 kg. As hastes têm massa **desprezível** e comprimentos $l_1 = 4$ m e $l_2 = 2$ m, muito maiores que o diâmetro das esferas. O momento de inércia do sistema em relação ao eixo x é:

- A $I = 30 \text{ kg.m}^2$
- B $I = 12 \text{ kg.m}^2$
- C $I = 24 \text{ kg.m}^2$
- D $I = 6 \text{ kg.m}^2$
- E Não sei responder

Considere o sistema da figura abaixo. Cada uma das esferas (pequenas) têm massa 3 kg. As hastes têm massa desprezível e comprimentos $l_1 = 4$ m e $l_2 = 2$ m, muito maiores que o diâmetro das esferas. O momento de inércia do sistema, em relação ao eixo y é:

- A $I = 30 \text{ kg.m}^2$
- B $I = 12 \text{ kg.m}^2$
- C $I = 24 \text{ kg.m}^2$
- D $I = 6 \text{ kg.m}^2$
- E Não sei responder

Considere o sistema da figura abaixo. Cada uma das esferas (pequenas) têm massa 3 kg. As hastes têm massa desprezível e comprimentos $l_1 = 4$ m e $l_2 = 2$ m, muito maiores que o diâmetro das esferas. O momento de inércia do sistema, em relação ao eixo z é:

- A $I = 30 \text{ kg.m}^2$
- B $I = 12 \text{ kg.m}^2$
- C $I = 24 \text{ kg.m}^2$
- D $I = 6 \text{ kg.m}^2$
- E Não sei responder

Suponha que o sistema da figura gire em torno do eixo z com velocidade escalar angular constante e igual a 5 rad/s. A velocidade escalar de cada esfera ligada à haste 1 é portanto 10 m/s e de cada esfera ligada à haste 2 é 5 m/s. Qual é a soma das energias cinéticas das partículas?

- A 375 J
- B 650 J
- C 275 J
- D Não sei responder

Esferas de 3 kg

Suponha que o sistema da figura gire em torno do eixo z com velocidade escalar angular constante e igual a 5 rad/s. A velocidade escalar de cada esfera ligada à haste 1 é portanto 10 m/s e de cada esfera ligada à haste 2 é 5 m/s. **Qual a energia cinética de rotação do conjunto? Qual a energia cinética total?**

- A 375 J e 375 J
- B 0 J e 375 J
- C 375 J e 0 J
- D 375 J e 750 J

Esferas de 3 kg

Momento de inércia de um bastão muito fino,
em torno de um eixo perpendicular que passa pelo CM

Aquecimento: CM de um bastão muito fino

Situação para a qual já sabemos a resposta: CM na origem!

$$dm = \mu dx = \frac{M}{L} dx$$

$$X_{CM} = \frac{1}{M} \int x dm = \frac{1}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x dx = \frac{1}{L} \frac{x^2}{2} \Big|_{-L/2}^{L/2} = 0$$

Aquecimento: CM de um bastão muito fino

Situação para a qual já sabemos a resposta: CM em $-L/2$!

$$dm = \mu dx = \frac{M}{L} dx$$

$$X_{CM} = \frac{1}{M} \int x dm = \frac{1}{L} \int_{-L}^0 x dx = \frac{1}{L} \frac{x^2}{2} \Big|_{-L}^0 = -\frac{L}{2}$$

Momento de inércia de um bastão muito fino,
em torno de um eixo perpendicular que passa pelo CM

$$dm = \mu dx = \frac{M}{L} dx$$

$$I_{CM} = \int x^2 dm = \frac{M}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x^2 dx$$

Momento de inércia de um bastão muito fino, em torno de um eixo perpendicular que passa pela borda

$$dm = \mu dx = \frac{M}{L} dx$$

$$I_O = \int x^2 dm = \frac{M}{L} \int_{-L}^0 x^2 dx$$

Comparem com o resultado anterior e o “teorema dos eixos paralelos”

Momento de inércia de uma porta,
em torno de um eixo paralelo que passa pelo CM

$$dm = \sigma dx dy = \frac{M}{ab} dx dy$$

$$I_{CM} = \int r^2 dm = \frac{M}{ab} \int_{-a/2}^{a/2} \int_0^b x^2 dx dy$$

Momento de inércia de uma porta,
em torno de um eixo perpendicular que passa pelo CM

$$dm = \sigma dx dy = \frac{M}{ab} dx dy$$

$$I_{CM} = \int r^2 dm = \frac{M}{ab} \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-b/2}^{b/2} (x^2 + y^2) dx dy$$

Momento de inércia de um aro muito fino,
em torno de um eixo perpendicular que passa pelo CM

$$dm = \mu R d\theta = \frac{M}{2\pi R} R d\theta$$

$$dm = \frac{M}{2\pi} d\theta$$

$$I_{CM} = \int R^2 dm = \frac{M}{2\pi} \int_0^{2\pi} R^2 d\theta = MR^2$$

Momento de inércia de um disco,
em torno de um eixo perpendicular que passa pelo CM

$$dm = \sigma r dr d\theta = \frac{M}{\pi R^2} r dr d\theta$$

$$I_{CM} = \int r^2 dm = \frac{M}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} \int_0^R r^3 dr d\theta$$

Momento de inércia de uma placa furada, em torno de um eixo perpendicular que passa pelo centro geométrico

Como fica???